

Schütz Deinen Kopf!

Fragebogen zu Symptomen nach Gehirnerschütterung Beantwortung durch Eltern des betroffenen Kindes

Markieren Sie in der jeweiligen Zeile, ob das Symptom bei Ihrem Kind vorhanden ist (1-3) oder nicht (0). Falls dieses Symptom besteht, markieren Sie, wie häufig sie meinen, dass das Symptom besteht: 1 = selten, 2 = manchmal, 3 = oft

Symptom	0	1	2	3
hat Schwierigkeiten, aufmerksam zu bleiben	0	1	2	3
lässt sich leicht ablenken	0	1	2	3
hat Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren	0	1	2	3
hat Probleme, sich zu merken, was ihm gesagt wurde	0	1	2	3
hat Schwierigkeiten, Anweisungen zu folgen	0	1	2	3
träumt am Tag zu viel/ neigt zu Tagträumen	0	1	2	3
ist verwirrt	0	1	2	3
ist vergesslich	0	1	2	3
kann Dinge nur schwer zu Ende bringen	0	1	2	3
hat schwache Fähigkeiten, Probleme zu lösen	0	1	2	3
hat Lernschwierigkeiten	0	1	2	3
hat Kopfschmerzen	0	1	2	3
fühlt sich schwindelig	0	1	2	3
hat das Gefühl, der Raum dreht sich	0	1	2	3
hat das Gefühl, ohnmächtig zu werden	0	1	2	3
sieht verschwommen	0	1	2	3
sieht Doppelbilder	0	1	2	3
verspürt Übelkeit	0	1	2	3
wird oft müde	0	1	2	3
wird leicht müde	0	1	2	3

nach: McCrory P, Meeuwisse W, Aubry M, Cantu B, Dvorák J, Echemendia R, Engebretsen L, Johnston K, Kutcher J, Raftery M, Sills A, Benson B, Davis G, Ellenbogen R, Guskiewicz K, Herring S, Iverson G, Jordan B, Kissick J, McCrea M, et al. Consensus statement on concussion in sport: the 4th International Conference on Concussion in Sport held in Zurich, November 2012. Br J Sports Med (2013). 47: 250-258.